



ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

- Предупреждение контактов с больными активной формой туберкулеза
- Вакцинация против туберкулеза в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

Противотуберкулезная вакцинация обеспечивает предупреждение тяжелых распространенных форм заболевания у детей, снижает риск летальных исходов.

ДИАГНОСТИКА

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА МАНТУ

Это не прививка, а диагностический тест на присутствие в организме микобактерий туберкулеза.



Она проводится независимо от результатов предыдущей пробы 1 раз в год детям от 12 месяцев до 7 лет в условиях образовательного учреждения или в поликлинике по месту жительства. Детям из группы риска пробы Манту ставятся 2 раза в год в условиях поликлиники.

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА ДИАСКИНТЕСТ

Современный диагностический препарат с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. Диаскинвест проводится так же, как Манту: делают внутрикожную инъекцию и проверяют результат через 72 часа. Ежегодно проводится детям с 8 до 17 лет.



ФЛЮОРОГРАФИЯ

Способ диагностики туберкулеза легких у лиц старше 15 лет 1 раз в год (кроме отдельных групп населения).

СИМПТОМЫ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ НА ТУБЕРКУЛЕЗ



- **Увеличение** периферических лимфатических узлов
- **Наличие крови** в мокроте
- **Боль** в груди
- **Кашель** на протяжении 2-3 недель и более
- **Периодическое** повышение температуры
- **Одышка**
- **Потеря веса**
- **Потливость** по ночам
- **Общее недомогание** и слабость.

В ГРУППЕ РИСКА ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ, ИМЕЮЩИЕ:

- **Контакт** с больными туберкулезом людьми:
 - Тесный семейный
 - Тесный квартирный
 - Производственный (на работе, в школе)
 - Случайный
- **Контакт** с больными туберкулезом животными
- **Отсутствие** вакцинации против туберкулеза (БЦЖ, БЦЖ-М)
- **Сопутствующие** хронические заболевания:
 - Инфекции мочевыводящих путей, хронический бронхит, хронические гноино-воспалительные заболевания органов дыхания, сахарный диабет, анемия, психоневрологическая патология, заболевания, требующие длительной цитостатической, иммуносупрессивной терапии (более одного месяца)
- **Беспризорность** детей и подростков, попадание детей в детские приюты, детские дома, социальные центры и т.д., лишение родителей родительских прав
- **Мигранты**, беженцы и др.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПРО ТУБЕРКУЛЕЗ

МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА — крупные палочки, чрезвычайно живучие, выдерживают нагревание до **90 °C**, низкие температуры — до **-260 °C**, высушивание, хорошо сохраняются во влажной среде, но не выдерживают прямого солнечного света.



ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ через воздух или предметы при контакте с больным с активной формой туберкулеза.

ЗАРАЖЕНИЕ ВОЗМОЖНО при употреблении молока и молочных продуктов, мяса животных, больных туберкулезом.